



Presentación de resultados

Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva 2013

ENSSyR 2013

Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva 2013

ENSSyR 2013

Presentación de resultados

Introducción

En este informe se presentan los principales resultados de la Encuesta Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva 2013 (ENSSyR 2013), el primer estudio sobre la temática que se realiza en el país a nivel nacional. Esta encuesta se realizó en el marco de un convenio suscripto entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios, y las Direcciones Provinciales de Estadística.

El *objetivo general* de esta encuesta consistió en generar información acerca de la salud sexual y reproductiva de *los varones de 14 a 59 años y las mujeres de 14 a 49 años en centros urbanos de 2.000 o más habitantes.*

Los *objetivos específicos* fueron:

- identificar el grado de conocimiento sobre métodos anticonceptivos;
- indagar sobre el uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, la edad en que se utilizan dichos métodos por primera vez y el uso actual de los mismos;
- describir los motivos por los cuales no se utilizan métodos anticonceptivos en distintos momentos de la vida de la población;
- identificar las prácticas preventivas en torno a la salud sexual y reproductiva desarrolladas por las mujeres y los varones;
- caracterizar la historia de la fecundidad de las mujeres;
- describir los cuidados y controles durante el embarazo del último hijo nacido vivo;
- indagar sobre la cantidad de hijos vivos y por el deseo de tener otro hijo;
- indagar sobre los comportamientos de las mujeres respecto a la lactancia;
- conocer las prácticas preventivas en torno a las enfermedades de transmisión sexual;
- caracterizar la situación demográfica y laboral de los varones y mujeres.

Este estudio permitió obtener información para las 6 regiones estadísticas del país. Estas regiones están compuestas de la siguiente manera:

- **Gran Buenos Aires:** Ciudad de Buenos Aires y 24 Partidos del Conurbano Bonaerense.
- **Pampeana:** provincias de Buenos Aires (excluyendo los 24 Partidos del Conurbano Bonaerense), Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe.
- **Noroeste:** provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
- **Noreste:** provincias del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.
- **Cuyo:** provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.
- **Patagónica:** provincias del Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El diseño muestral de la ENSSyR fue probabilístico y multietápico y se realizó de manera asociada a la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU), en el marco del Sistema Integrado de Encuestas a Hogares (SIEH). Esto significa que la muestra de viviendas se seleccionó sobre aquellas viviendas de la EAHU del tercer trimestre de 2012 con al menos una mujer de 14 a 49 años y/o al menos un varón de 14 a 59 años.

La utilización de la EAHU como marco de muestreo de la ENSSyR tuvo como principal objetivo facilitar el contacto de la población objetivo.

El relevamiento de los datos fue llevado a cabo entre mayo y junio de 2013 en conjunto con las Direcciones Provinciales de Estadística.

Resumen ejecutivo | Principales resultados

Conocimiento de métodos anticonceptivos

En relación con el conocimiento de métodos anticonceptivos, un 94% de las mujeres entrevistadas mencionó las pastillas anticonceptivas, un 87% al preservativo o condón y un 62% el DIU. Entre los varones, el método más nombrado es el preservativo o condón, con un 95%; luego, un 82% mencionó a las pastillas anticonceptivas, y un 37% el DIU.

Edad de la primera relación sexual

Entre las mujeres de 14 a 49 años que han tenido su primera relación sexual, la edad promedio de la primera relación es de 17,3 años. En tanto para los varones de entre 14 y 59 años que tuvieron relaciones sexuales alguna vez, la edad promedio de inicio es de 16,0 años.

Uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual

Casi siete de cada diez de las mujeres y los varones entrevistados usaron algún método anticonceptivo en su primera relación sexual. El método más utilizado en esta instancia fue el preservativo o condón, mencionado por nueve de cada diez entrevistados de ambos sexos.

Uso de métodos anticonceptivos en la actualidad

Ocho de cada diez de las mujeres y los varones -o la persona con la que tiene relaciones sexuales- usan métodos anticonceptivos actualmente. Entre las mujeres, los métodos más utilizados son los hormonales (pastillas, inyectables, parches o implantes) en un 51% de los casos, seguidos de los métodos de barrera (preservativo, diafragma o espumas, jaleas u óvulos) con un 30%. Entre los varones, un 49% utiliza anticoncepción de barrera, y un 38% anticonceptivos hormonales.

Obtención gratuita del método anticonceptivo principal utilizado

Un 32% de las mujeres declara haber obtenido de forma gratuita el método anticonceptivo que utiliza. Entre los varones, un 22% lo obtuvo gratuitamente.

Cantidad de hijos nacidos vivos

Para el total del país, las mujeres con hijos nacidos vivos han tenido un promedio de 2,5 hijos por mujer. Entre los varones que han tenido hijos nacidos vivos, este promedio asciende a 2,6 hijos.

Conocimiento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH/SIDA

Casi la totalidad de los varones y de las mujeres entrevistados manifestaron conocer al VIH/SIDA, acercándose al 100% de los casos. La hepatitis B es la segunda ITS más mencionada, por un 90% de las mujeres y un 87% de los varones; en tercer lugar, la sífilis/chancro fue nombrada por el 75% de las mujeres y el 78% de los varones. El herpes genital es la cuarta ITS más conocida por los entrevistados -67% de las mujeres y 60% de los varones-, mientras que la mitad nombró a la gonorrea/bleenorragia. El resto de las ITS fueron menos mencionadas.

Cantidad de controles realizados durante el embarazo

Más de nueve de cada diez mujeres declararon haberse realizado cinco o más controles durante el embarazo de su último hijo nacido vivo, siendo escasas las que se han realizado menos controles o ninguno.

Lactancia

La gran mayoría de las mujeres -un 94%- le dieron el pecho a su último hijo nacido vivo, o le están dando actualmente. Entre las que ya no amamantan a su último hijo, casi el 28% de ellas abandonó la lactancia antes de los 6 meses.

Análisis descriptivo de resultados

1. Caracterización de la población

Se presentan a continuación dos tablas que dan cuenta de la estructura de la población bajo estudio: los varones de 14 a 59 años y las mujeres de 14 a 49 años.

Estas tablas muestran los resultados para la población tanto en términos absolutos como en porcentajes, sirviendo a modo de referencia para la lectura de las tablas del resto del informe, que se expresan sólo con porcentajes.

Tabla 1. Varones de 14 a 59 años clasificados por grupo de edad y región. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013

| Varones de 14 a 59 años | Frecuencia | Porcentaje |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Total del país | 11.102.600 | 100 |
| Región | | |
| GBA | 3.639.700 | 33,0 |
| Pampeana | 3.787.300 | 34,3 |
| Noroeste | 1.339.800 | 12,2 |
| Noreste | 978.200 | 8,9 |
| Cuyo | 678.100 | 6,2 |
| Patagónica | 602.800 | 5,5 |
| Grupo de edad | | |
| 14 a 19 años | 2.252.500 | 20,4 |
| 20 a 29 años | 2.695.800 | 24,4 |
| 30 a 39 años | 2.252.500 | 20,4 |
| 40 a 49 años | 2.047.400 | 18,6 |
| 50 a 59 años | 1.777.700 | 16,1 |

Fuente: ENSSyR 2013.

Tabla 2. Mujeres de 14 a 49 años clasificadas por grupo de edad y región. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013

| Mujeres de 14 a 49 años | Frecuencia | Porcentaje |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Total del país | 9.754.100 | 100 |
| Región | | |
| GBA | 3.327.400 | 34,1 |
| Pampeana | 3.232.400 | 33,1 |
| Noroeste | 1.185.400 | 12,2 |
| Noreste | 877.000 | 9,0 |
| Cuyo | 605.500 | 6,2 |
| Patagónica | 526.300 | 5,4 |
| Grupo de edad | | |
| 14 a 19 años | 2.113.500 | 21,7 |
| 20 a 29 años | 2.691.500 | 27,6 |
| 30 a 39 años | 2.320.800 | 23,8 |
| 40 a 49 años | 2.628.200 | 26,9 |

Fuente: ENSSyR 2013.

2. Conocimiento de métodos anticonceptivos

Para indagar acerca del conocimiento de métodos anticonceptivos se formuló una pregunta a través de la cual se le solicitó al entrevistado que enumerara de forma espontánea los métodos anticonceptivos que conocía.

Entre las mujeres, se observa que un 94% mencionó conocer las pastillas anticonceptivas, seguido de un 87% que mencionó al preservativo o condón. Seis de cada diez mujeres mencionaron el DIU, espiral o T de cobre, y cuatro de cada diez, los anticonceptivos inyectables. En porcentajes menores al 20% se ubicó la mención de métodos como la ligadura de trompas, el ritmo, la pastilla del día después o el diafragma.

Tabla 3. Conocimiento de métodos anticonceptivos en mujeres de 14 a 49 años, por región. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013

| Mujeres de 14 a 49 años | Conocimiento de métodos anticonceptivos | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|---|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| | Pastilla anticonceptiva | Preservativo o condón | DIU, espiral, T de cobre | Anticonceptivo inyectable | Ligadura de trompas | Ritmo | Pastilla del día después o anticoncepción de emergencia | Diafragma | Retiro | Vasectomía | Otro | Ninguno/nada |
| Total del país | 93,9 | 86,9 | 61,8 | 38,0 | 17,9 | 10,3 | 9,7 | 8,8 | 5,0 | 4,5 | 12,1 | 1,3 |
| Región | | | | | | | | | | | | |
| GBA | 93,6 | 90,0 | 72,2 | 27,1 | 12,7 | 9,5 | 7,6 | 11,2 | 5,2 | 1,8 | 10,8 | 1,6 |
| Pampeana | 96,1 | 88,7 | 56,6 | 37,3 | 22,1 | 11,6 | 12,0 | 8,6 | 5,6 | 6,8 | 15,0 | 0,8 |
| Noroeste | 89,0 | 75,8 | 53,5 | 57,2 | 19,0 | 11,4 | 11,2 | 3,7 | 5,1 | 4,5 | 9,8 | 1,6 |
| Noreste | 93,0 | 81,9 | 44,9 | 44,3 | 13,1 | 6,4 | 5,2 | 5,4 | 2,7 | 1,7 | 5,9 | 2,2 |
| Cuyo | 93,2 | 87,1 | 62,6 | 43,4 | 20,4 | 14,0 | 11,1 | 11,3 | 5,5 | 7,0 | 16,4 | 1,0 |
| Patagónica | 95,9 | 89,3 | 73,3 | 50,2 | 28,3 | 7,0 | 11,5 | 9,5 | 3,6 | 9,9 | 12,5 | 0,2 |

Fuente: ENSSyR 2013.


Entre los varones, el método más mencionado es el preservativo o condón, con un 95%, seguido de las pastillas anticonceptivas, con un 82%. Cuatro de cada diez varones mencionaron al DIU, espiral o T de cobre, y dos de cada diez a los anticonceptivos inyectables. El resto de los métodos fueron nombrados por menos de un 10% de los entrevistados. En comparación con los varones, las mujeres muestran conocer con mayor frecuencia relativa los mismos métodos anticonceptivos.

Tabla 4. Conocimiento de métodos anticonceptivos en varones de 14 a 59 años, por región. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013

| Varones de 14 a 59 años | Conocimiento de métodos anticonceptivos | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | Preservativo o condón | Pastilla anticonceptiva | DIU, espiral, T de cobre | Anticonceptivo inyectable | Ligadura de trompas | Retiro | Pastilla del día después o anticoncepción de emergencia | Ritmo | Diafragma | Vasectomía | Otro | Ninguno/nada |
| Total del país | 95,1 | 81,7 | 37,3 | 20,8 | 10,2 | 7,8 | 7,3 | 5,7 | 5,7 | 4,3 | 6,5 | 1,7 |
| GBA | 96,9 | 76,3 | 46,6 | 9,7 | 7,4 | 5,8 | 5,4 | 3,8 | 6,5 | 1,8 | 5,7 | 1,2 |
| Pampeana | 96,3 | 90,9 | 35,7 | 25,0 | 12,2 | 11,2 | 8,2 | 6,3 | 6,6 | 5,5 | 7,4 | 0,3 |
| Noroeste | 91,7 | 75,8 | 27,4 | 33,6 | 13,1 | 7,9 | 9,6 | 8,5 | 4,5 | 6,1 | 8,2 | 0,4 |
| Noreste | 90,1 | 73,0 | 19,6 | 24,1 | 6,9 | 6,5 | 7,8 | 4,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 5,2 |
| Cuyo | 94,1 | 79,5 | 36,3 | 23,8 | 9,5 | 5,9 | 5,7 | 10,5 | 4,6 | 6,3 | 9,4 | 1,2 |
| Patagónica | 94,6 | 86,0 | 42,9 | 24,3 | 14,2 | 3,2 | 8,8 | 4,2 | 3,5 | 8,9 | 4,1 | 1,7 |

Fuente: ENSSyR 2013.

Gráfico 1. Conocimiento de métodos anticonceptivos en mujeres de 14 a 49 años y varones de 14 a 59 años, por sexo. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013



Fuente: ENSSyR-2013.

Para el total de las mujeres del país que han tenido relaciones sexuales alguna vez⁽¹⁾, la mediana de la edad de la primera relación sexual es de 17 años; es decir, la mitad de ellas se concentra en

⁽¹⁾ Mientras que casi el total de las mujeres entrevistadas de 20 años o más ha tenido su primera relación sexual, en el grupo de 14 a 19 años son casi cinco de cada diez (44,5%).

este valor o en valores inferiores. Respecto de la media, para el total de las mujeres de 14 a 49 años, es de 17,3 años. Comparando por región, la media de edad de inicio sexual es más alta en Cuyo y el Noroeste, y más baja en el Noreste y la región Pampeana.

Al analizar por grupo de edad, mientras que las mujeres de 40 a 49 años declaran haber tenido su primera relación sexual alrededor de los 18 años, este promedio desciende con la edad de las entrevistadas: entre las más jóvenes, la media de edad de inicio sexual es de 15,5 años.

Tabla 5. Media y mediana de edad (en años) de la primera relación sexual en mujeres de 14 a 49 años que han tenido su primera relación sexual, por región y grupo de edad. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013

| Mujeres de 14 a 49 años | Edad de la primera relación sexual | |
|-------------------------|------------------------------------|-----------|
| | Media | Mediana |
| Total del país | 17,3 | 17 |
| Región | | |
| GBA | 17,3 | 17 |
| Pampeana | 17,1 | 17 |
| Noroeste | 17,5 | 17 |
| Noreste | 16,9 | 17 |
| Cuyo | 17,9 | 18 |
| Patagónica | 17,2 | 17 |
| Grupo de edad | | |
| 14 a 19 años | 15,5 | 15 |
| 20 a 29 años | 17,1 | 17 |
| 30 a 39 años | 17,6 | 17 |
| 40 a 49 años | 17,9 | 18 |

Fuente: ENSSyR 2013.

La mitad de los varones de 14 a 59 años ha tenido su primera relación sexual a los 16 años o antes⁽²⁾ coincidiendo con el valor promedio de inicio. Se observan escasas diferencias por región: la media más alta se registra en Cuyo, con 16,5.

Al igual que entre las mujeres, a medida que aumenta la edad la ocurrencia de la primera relación sexual ha sido más tardía. Entre los varones más jóvenes, la media de edad de inicio es de 14,9 años, mientras que entre los más adultos, entre 50 y 59 años, se incrementa hasta llegar a los 16,5 años.

⁽²⁾ Mientras que casi el total de los varones entrevistados de 20 años o más ha tenido su primera relación sexual, en el grupo de 14 a 19 años son poco más de cinco de cada diez (53,2%).

Tabla 6. Media y mediana de edad (en años) de la primera relación sexual en varones de 14 a 59 años que han tenido su primera relación sexual, por región y grupo de edad. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013

| Varones de 14 a 59 años | Edad de la primera relación sexual | |
|-------------------------|------------------------------------|-----------|
| | Media | Mediana |
| Total del país | 16,0 | 16 |
| Región | | |
| GBA | 16,1 | 16 |
| Pampeana | 16,0 | 16 |
| Noroeste | 16,1 | 16 |
| Noreste | 15,9 | 16 |
| Cuyo | 16,5 | 16 |
| Patagónica | 16,2 | 16 |
| Grupo de edad | | |
| 14 a 19 años | 14,9 | 15 |
| 20 a 29 años | 15,9 | 16 |
| 30 a 39 años | 16,3 | 16 |
| 40 a 49 años | 16,1 | 16 |
| 50 a 59 años | 16,5 | 16 |

Fuente: ENSSyR 2013.

1. Uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual

Casi siete de cada diez mujeres manifiestan haber utilizado algún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Al comparar por región, el Gran Buenos Aires y la región Pampeana presentan porcentajes superiores al promedio del país; por el contrario, en el Noroeste sólo la mitad de las mujeres utilizó métodos anticonceptivos en esta instancia. Con inferiores porcentajes al promedio en este indicador (alrededor del 60%) se encuentran también las regiones de Noreste, Cuyo y Patagónica.

Por grupo de edad se observan significativas diferencias: mientras que un 90% de las mujeres de 14 a 19 años utilizó alguno de estos métodos en su primera relación sexual, este porcentaje desciende con la edad, llegando a sólo un 49% entre las mujeres de 40 a 49 años.

Tabla 7. Uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual en mujeres de 14 a 49 años, por región y grupo de edad. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013

| Mujeres de 14 a 49 años | Uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual | | | |
|-------------------------|--|-------------|-------------|-------|
| | Total | Sí | No | Ns/Nc |
| Total del país | 100 | 68,4 | 31,6 | - - |
| Región | | | | |
| GBA | 100 | 74,8 | 25,2 | - - |
| Pampeana | 100 | 72,4 | 27,5 | 0,1 |
| Noroeste | 100 | 49,0 | 51,0 | - - |
| Noreste | 100 | 62,9 | 37,1 | - - |
| Cuyo | 100 | 61,1 | 38,9 | - - |
| Patagónica | 100 | 61,3 | 38,7 | - - |
| Grupo de edad | | | | |
| 14 a 19 años | 100 | 90,4 | 9,6 | - - |
| 20 a 29 años | 100 | 82,4 | 17,5 | 0,1 |
| 30 a 39 años | 100 | 65,7 | 34,3 | - - |
| 40 a 49 años | 100 | 49,1 | 50,9 | - - |

Fuente: ENSSyR 2013.

Un 65% de los varones declaran haber utilizado algún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Al igual que en el caso de las mujeres, las regiones de GBA y Pampeana presentan los mayores porcentajes de uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, mientras que, en las regiones de Noroeste y Cuyo, poco más de cinco de cada diez varones los han utilizado.


Al analizar por grupo de edad, la tendencia es similar a la observada entre las mujeres. Casi nueve de cada diez varones en el grupo más joven los utilizaron; entre los de 30 a 39 años, siete de cada diez, y entre los de 50 a 59, sólo casi cuatro de cada diez usaron métodos anticonceptivos en su primera relación sexual.

Tabla 8. Uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual en varones de 14 a 59 años, por región y grupo de edad. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013

| Varones de 14 a 59 años | Uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual | | |
|-------------------------|--|-------------|-------------|
| | Total | Sí | No |
| Total del país | 100 | 65,2 | 34,8 |
| Región | | | |
| GBA | 100 | 68,3 | 31,7 |
| Pampeana | 100 | 70,0 | 30,0 |
| Noroeste | 100 | 52,1 | 47,9 |
| Noreste | 100 | 61,7 | 38,3 |
| Cuyo | 100 | 55,2 | 44,8 |
| Patagónica | 100 | 61,4 | 38,6 |
| Grupo de edad | | | |
| 14 a 19 años | 100 | 87,1 | 12,9 |
| 20 a 29 años | 100 | 84,3 | 15,7 |
| 30 a 39 años | 100 | 69,6 | 30,4 |
| 40 a 49 años | 100 | 46,7 | 53,3 |
| 50 a 59 años | 100 | 38,9 | 61,1 |

Fuente: ENSSyR 2013.

Gráfico 2. Uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual en mujeres de 14 a 49 años y varones de 14 a 59 años, por grupo de edad y sexo. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013



Fuente: ENSSyR-2013.

Con relación al uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, en el cuestionario se indagó sobre cada uno de ellos por separado. De esta manera, el entrevistado pudo haber declarado el uso de más de un método.

De las mujeres que han utilizado algún método anticonceptivo en su primera relación sexual, una amplia mayoría usó preservativo o condón (90%). En segundo lugar se ubican las pastillas anticonceptivas, inyectables o implantes, con un 14%. El uso del resto de los métodos es poco relevante porcentualmente para el análisis.

En la comparación por grupo de edad, el uso de preservativo o condón es más frecuente entre las más jóvenes -mujeres de 14 a 19 años y de 20 a 29 años, con un 93% y un 97%, respectivamente-.

La tendencia es inversa en el caso de las pastillas, inyectables o implantes: son las más adultas quienes los usaron en mayor medida en su primera relación sexual, alcanzando un 23% entre las de 40 a 49 años.

Tabla 9. Tipo de método anticonceptivo utilizado en la primera relación sexual en mujeres de 14 a 49 años, por región y grupo de edad. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013

| Mujeres de 14 a 49 años | Tipo de método anticonceptivo utilizado en la primera relación sexual | | | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|------------|-----|-----------|------------|
| | Preservativo o condón | Pastillas, inyectables o implantes | Retiro | DIU | Diafragma | Otro |
| Total del país | 90,0 | 13,9 | 1,7 | -- | -- | 0,7 |
| Región | | | | | | |
| GBA | 91,5 | 8,4 | 2,6 | -- | -- | 0,5 |
| Pampeana | 88,5 | 20,0 | 1,2 | -- | -- | 1,1 |
| Noroeste | 89,7 | 13,8 | 1,0 | 0,3 | -- | 0,5 |
| Noreste | 88,7 | 12,4 | 2,5 | 0,2 | -- | -- |
| Cuyo | 90,0 | 17,2 | -- | -- | -- | 0,3 |
| Patagónica | 92,1 | 12,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,9 |
| Grupo de edad | | | | | | |
| 14 a 19 años | 93,3 | 12,8 | 2,3 | 0,1 | -- | 0,1 |
| 20 a 29 años | 96,9 | 10,8 | 0,6 | -- | 0,1 | 0,3 |
| 30 a 39 años | 90,4 | 11,5 | 1,7 | -- | -- | 0,9 |
| 40 a 49 años | 76,1 | 22,6 | 3,3 | 0,1 | -- | 1,5 |

Fuente: ENSSyR 2013.

Entre los varones que afirman haber usado métodos anticonceptivos en su primera relación sexual, un 93% utilizó preservativo o condón, y apenas un 7% pastillas, inyectables o implantes⁽³⁾.

Se observan diferencias relevantes por grupo de edad: el uso de preservativo o condón desciende a medida que aumenta la edad, así como la utilización de pastillas, inyectables o implantes. Por el contrario, entre los varones de 50 a 59 años, el método de retiro está sobrerrepresentado respecto al total, con un 11%.

⁽³⁾ El "uso de métodos anticonceptivos" no refiere sólo al uso por parte del propio entrevistado, sino también por parte de la persona con la que tuvo la primera relación sexual. El mismo criterio rige para el uso de métodos anticonceptivos en la actualidad.

Tabla 10. Tipo de método anticonceptivo utilizado en la primera relación sexual en varones de 14 a 59 años, por región y grupo de edad. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013

| Varones de 14 a 59 años | Tipo de método anticonceptivo utilizado en la primera relación sexual | | | | | |
|----------------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|
| | Preservativo o condón | Pastillas, inyectables o implantes | Retiro | DIU | Diafragma | Otro |
| Total del país | 93,2 | 7,2 | 3,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Región | | | | | | |
| GBA | 92,5 | 5,0 | 5,5 | 0,2 | -- | 0,4 |
| Pampeana | 93,5 | 8,7 | 2,6 | -- | 0,1 | 0,1 |
| Noroeste | 92,0 | 8,3 | 1,7 | -- | -- | 0,2 |
| Noreste | 94,0 | 7,2 | 0,3 | -- | 0,7 | 0,9 |
| Cuyo | 97,5 | 5,6 | -- | -- | -- | -- |
| Patagónica | 93,7 | 10,8 | 0,2 | 0,3 | -- | 0,1 |
| Grupo de edad | | | | | | |
| 14 a 19 años | 93,5 | 9,7 | 3,5 | -- | 0,2 | -- |
| 20 a 29 años | 95,9 | 8,5 | 0,4 | -- | 0,2 | 0,1 |
| 30 a 39 años | 95,2 | 5,5 | 2,8 | 0,1 | -- | -- |
| 40 a 49 años | 90,7 | 6,4 | 3,4 | -- | -- | 0,1 |
| 50 a 59 años | 83,3 | 4,0 | 10,7 | 0,5 | -- | 2,0 |

Fuente: ENSSyR 2013.

2. Uso de métodos anticonceptivos en la actualidad

En relación con el uso de métodos anticonceptivos en la actualidad, ocho de cada diez mujeres manifiestan utilizarlos. Su uso desciende cuando aumenta la edad: entre las más jóvenes los utilizan nueve de cada diez, pero entre el grupo de edad más avanzado -40 a 49 años- son sólo siete de cada diez.

Al comparar por situación conyugal, se observa que un 77% de las unidas o casadas utilizan métodos anticonceptivos actualmente, ascendiendo a un 94% entre las solteras.

Por nivel de instrucción, un 74% de las mujeres con hasta primario completo utilizan actualmente métodos anticonceptivos. A medida que aumenta el nivel de instrucción, el uso también aumenta: entre las que tienen secundario completo asciende a un 83%, y para las mujeres con terciario o universitario incompleto y más, a un 85%.

Tabla 11. Utilización de métodos anticonceptivos en la actualidad en mujeres de 14 a 49 años por grupo de edad, situación conyugal y nivel de instrucción. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013

| Mujeres de 14 a 49 años | Utilización de métodos anticonceptivos en la actualidad | | |
|--|---|-------------|-------------|
| | Total | Sí | No |
| Total del país | 100 | 81,3 | 18,7 |
| Grupo de edad | | | |
| 14 a 19 años | 100 | 90,1 | 9,9 |
| 20 a 29 años | 100 | 87,2 | 12,8 |
| 30 a 39 años | 100 | 82,7 | 17,3 |
| 40 a 49 años | 100 | 71,6 | 28,4 |
| Situación conyugal | | | |
| Unida o casada | 100 | 76,6 | 23,4 |
| Separada, divorciada o viuda | 100 | 85,2 | 14,8 |
| Soltera | 100 | 94,4 | 5,6 |
| Nivel de instrucción | | | |
| Hasta primario completo | 100 | 73,6 | 26,4 |
| Secundario incompleto | 100 | 80,8 | 19,2 |
| Secundario completo | 100 | 82,7 | 17,3 |
| Terciario o Universitario incompleto y más | 100 | 84,6 | 15,4 |

Fuente: ENSSyR 2013.

Ocho de cada diez varones de entre 14 y 59 años declaran usar métodos anticonceptivos actualmente. Este porcentaje varía por grupo de edad: los más jóvenes están sobrerrepresentados en este aspecto, con más del 90% de uso. Por el contrario, entre los varones de entre 50 y 59 años, sólo seis de cada diez utilizan métodos anticonceptivos en la actualidad.

Por situación conyugal, al igual que entre las mujeres entrevistadas, los varones unidos o casados son quienes menos utilizan métodos anticonceptivos, con un 71%. Entre los separados, divorciados o viudos los usan un 92%, y los solteros un 97%; ambos grupos están sobrerrepresentados en este aspecto.

Tabla 12. Utilización de métodos anticonceptivos en la actualidad en varones de 14 a 59 años por grupo de edad, situación conyugal y nivel de instrucción. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013

| Varones de 14 a 59 años | Utilización de métodos anticonceptivos en la actualidad | | |
|--|---|-------------|-------------|
| | Total | Sí | No |
| Total del país | 100 | 81,4 | 18,6 |
| Grupo de edad | | | |
| 14 a 19 años | 100 | 97,6 | 2,4 |
| 20 a 29 años | 100 | 92,4 | 7,6 |
| 30 a 39 años | 100 | 83,0 | 17,0 |
| 40 a 49 años | 100 | 78,7 | 21,3 |
| 50 a 59 años | 100 | 57,3 | 42,7 |
| Situación conyugal | | | |
| Unido o casado | 100 | 71,2 | 28,8 |
| Separado, divorciado o viudo | 100 | 91,8 | 8,2 |
| Soltero | 100 | 96,9 | 3,1 |
| Nivel de instrucción | | | |
| Hasta primario completo | 100 | 76,3 | 23,7 |
| Secundario incompleto | 100 | 82,9 | 17,1 |
| Secundario completo | 100 | 84,3 | 15,7 |
| Terciario o Universitario incompleto y más | 100 | 81,7 | 18,3 |

Fuente: ENSSyR 2013.

Respecto del tipo de método anticonceptivo utilizado en la actualidad, la mitad de las mujeres manifestaron usar algún tipo de anticonceptivo hormonal, como pastillas, inyectables, parches o implantes. Por otra parte, tres de cada diez utilizan métodos anticonceptivos de barrera, como preservativo, diafragma o espumas, jaleas u óvulos. La presencia del resto de los métodos, como DIU, espiral o T de cobre, anticoncepción quirúrgica -como la ligadura de trompas- o métodos tradicionales es inferior al 10% para cada uno de ellos. Entre los métodos tradicionales se incluyen el ritmo, el retiro, la lactancia, el método del moco cervical, los yuyos, hierbas o tés y otros.

Por grupo de edad, entre las más jóvenes -14 a 19 años y 20 a 29 años- se observa un mayor uso de anticonceptivos hormonales y de barrera. En las mujeres de edades más avanzadas, se reduce significativamente la utilización de anticoncepción hormonal, creciendo la elección del DIU, espiral o T de cobre, la anticoncepción quirúrgica y los métodos tradicionales, que están sobrerrepresentados en el grupo de 40 a 49 años.

Tabla 13. Tipo principal de método anticonceptivo utilizado en la actualidad en mujeres de 14 a 49 años, por grupo de edad. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013

| Mujeres de 14 a 49 años | Tipo principal de método anticonceptivo utilizado en la actualidad | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|-------------|---------------------------|------------|-------------|
| | Total | Hormonal | De barrera | DIU, espiral o T de cobre | Quirúrgico | Tradicional |
| Total del país | 100 | 50,5 | 29,7 | 9,2 | 6,9 | 3,8 |
| Grupo de edad | | | | | | |
| 14 a 19 años | 100 | 57,1 | 41,8 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
| 20 a 29 años | 100 | 58,7 | 33,4 | 4,6 | 1,9 | 1,4 |
| 30 a 39 años | 100 | 52,2 | 23,8 | 11,3 | 8,5 | 4,1 |
| 40 a 49 años | 100 | 36,6 | 27,0 | 15,3 | 13,5 | 7,6 |

Fuente: ENSSyR 2013.

Cinco de cada diez varones utilizan métodos anticonceptivos de barrera, y casi cuatro de cada diez, anticoncepción hormonal. El uso de otros métodos tiene baja incidencia en el universo de los varones entrevistados.


Los varones más jóvenes son quienes más mencionaron utilizar la anticoncepción de barrera -alrededor de seis de cada diez-. Del mismo modo que entre las mujeres, en los grupos de edad más avanzada tiende a reducirse el uso de anticoncepción hormonal y de barrera, aunque siguen siendo mayoritarios, aumentando su presencia relativa el uso de DIU y de métodos quirúrgicos.

Tabla 14. Tipo principal de método anticonceptivo utilizado en la actualidad en varones de 14 a 59 años, por grupo de edad. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013

| Varones de 14 a 59 años | Tipo principal de método anticonceptivo utilizado en la actualidad | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|-------------|---------------------------|------------|-------------|
| | Total | De barrera | Hormonal | DIU, espiral o T de cobre | Quirúrgico | Tradicional |
| Total del país | 100 | 48,6 | 37,9 | 6,8 | 4,9 | 1,8 |
| Grupo de edad | | | | | | |
| 14 a 19 años | 100 | 62,8 | 35,8 | 1,1 | -- | 0,3 |
| 20 a 29 años | 100 | 56,2 | 40,2 | 2,2 | 0,6 | 0,7 |
| 30 a 39 años | 100 | 43,7 | 38,3 | 10,0 | 5,9 | 2,1 |
| 40 a 49 años | 100 | 38,1 | 39,7 | 8,9 | 9,2 | 4,1 |
| 50 a 59 años | 100 | 44,5 | 30,3 | 12,8 | 11,0 | 1,4 |

Fuente: ENSSyR 2013.

Gráfico 3. Tipo principal de método anticonceptivo utilizado en la actualidad en mujeres de 14 a 49 años y varones de 14 a 59 años, por sexo. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013



Fuente: ENSSyR-2013.

En el total, tres de cada diez mujeres obtienen de forma gratuita el método anticonceptivo que utilizan; en su mayoría, las que tienen entre 14 y 19 años, con un 43%. Entre las mujeres más adultas, el grupo de edad de 30 a 39 años también está sobrerrepresentado en este indicador, con un 36% de obtención gratuita.

Al analizar por cobertura de salud, se observa que, entre las mujeres que tienen obra social o prepaga, poco más de dos de cada diez obtiene gratuitamente el método anticonceptivo. En cambio, entre las que no poseen cobertura, acceden de forma gratuita más de cuatro de cada diez.

Tabla 15. Obtención gratuita del método anticonceptivo utilizado en la actualidad por mujeres de 14 a 49 años, por grupo de edad y cobertura de salud. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013

| Mujeres de 14 a 49 años | Obtención gratuita del método anticonceptivo que utiliza | | | |
|---------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| | Total | Sí | No | Ns/Nc |
| Total del país | 100 | 32,2 | 67,4 | 0,4 |
| Grupo de edad | | | | |
| 14 a 19 años | 100 | 43,3 | 56,2 | 0,6 |
| 20 a 29 años | 100 | 28,1 | 71,6 | 0,3 |
| 30 a 39 años | 100 | 35,8 | 63,3 | 0,9 |
| 40 a 49 años | 100 | 28,9 | 71,0 | 0,2 |
| Cobertura de salud | | | | |
| Obra social o prepaga | 100 | 24,9 | 74,7 | 0,4 |
| Sin cobertura | 100 | 44,8 | 54,7 | 0,5 |

Fuente: ENSSyR 2013.

Sólo dos de cada diez varones obtienen gratuitamente el método anticonceptivo, concentrados, al igual que entre las mujeres, en el grupo de edad más joven -de 14 a 19 años-, y entre los de 30 a 39 años. Los varones de 20 a 29 años son quienes más compran el método anticonceptivo que utilizan: alrededor de un 80%.

Al observar por cobertura de salud -en relación a la obtención gratuita del método anticonceptivo que utiliza-, entre los varones que tienen obra social o prepaga sólo un 16% mencionó que los obtiene gratuitamente; por el contrario, entre los que no poseen cobertura de salud, este porcentaje se duplica, ascendiendo a un 34%.

Tabla 16. Obtención gratuita del método anticonceptivo utilizado en la actualidad por varones de 14 a 59 años, por grupo de edad y cobertura de salud. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013

| Varones de 14 a 59 años | Obtención gratuita del método anticonceptivo que utiliza | | | |
|---------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| | Total | Sí | No | Ns/Nc |
| Total del país | 100 | 22,2 | 76,7 | 1,1 |
| Grupo de edad | | | | |
| 14 a 19 años | 100 | 28,0 | 71,4 | 0,6 |
| 20 a 29 años | 100 | 17,1 | 80,4 | 2,5 |
| 30 a 39 años | 100 | 25,5 | 73,9 | 0,6 |
| 40 a 49 años | 100 | 23,2 | 76,4 | 0,4 |
| 50 a 59 años | 100 | 20,9 | 78,5 | 0,6 |
| Cobertura de salud | | | | |
| Obra social o prepaga | 100 | 15,6 | 83,4 | 1,0 |
| Sin cobertura | 100 | 33,6 | 65,1 | 1,3 |

Fuente: ENSSyR 2013.

4. Fecundidad

Con relación a la fecundidad, entre las mujeres que han tenido hijos nacidos vivos la media es de 2,5 hijos por mujer.

Al analizar por región, Noreste es la que tiene una media mayor de hijos por mujer, con 2,9. Noroeste, Cuyo y Patagónica presentan una media de 2,7, y GBA y Pampeana se ubican en una media de 2,4 hijos por mujer.

Como es de esperar, este indicador aumenta con la edad: entre las más jóvenes la media es de 1,2 hijos por mujer, y entre las de 40 a 49 años, es de 3,1. Del mismo modo, entre las mujeres unidas o casadas la media de hijos nacidos vivos es mayor que entre las solteras.

Observando por rango de ingreso del hogar, entre las mujeres cuyos hogares tienen un ingreso de \$0 hasta \$4.500, la fecundidad es mayor que en los demás rangos, con una media de 2,7. Por otra parte, esta relación inversamente proporcional se reitera al analizarla por nivel de instrucción: a menor nivel, mayor media de hijos por mujer. En el caso de las mujeres con hasta primario completo, la media es de 3,4, que desciende hasta llegar a 2,0 hijos por mujer entre las que manifiestan tener un nivel terciario o universitario incompleto y más.

Tabla 17. Media y mediana (en años) de cantidad de hijos nacidos vivos en mujeres de 14 a 49 años, por región, grupo de edad, situación conyugal, rango de ingreso del hogar y nivel de instrucción. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013

| Mujeres de 14 a 49 años | Cantidad de hijos nacidos vivos | |
|--|---------------------------------|----------|
| | Media | Mediana |
| Total del país | 2,5 | 2 |
| Región | | |
| GBA | 2,4 | 2 |
| Pampeana | 2,4 | 2 |
| Noroeste | 2,7 | 2 |
| Noreste | 2,9 | 2 |
| Cuyo | 2,7 | 2 |
| Patagónica | 2,7 | 2 |
| Grupo de edad | | |
| 14 a 19 años | 1,2 | 1 |
| 20 a 29 años | 1,6 | 1 |
| 30 a 39 años | 2,6 | 2 |
| 40 a 49 años | 3,1 | 3 |
| Situación conyugal | | |
| Unida o casada | 2,6 | 2 |
| Separada, divorciada o viuda | 2,7 | 2 |
| Soltera | 1,8 | 1 |
| Nivel de instrucción | | |
| Hasta primario completo | 3,4 | 3 |
| Secundario incompleto | 2,6 | 2 |
| Secundario completo | 2,1 | 2 |
| Terciario o Universitario incompleto y más | 2,0 | 2 |
| Rango de ingreso del hogar | | |
| 0 hasta 4.500 | 2,7 | 2 |
| 4.501 hasta 10.000 | 2,4 | 2 |
| 10.001 y más | 2,4 | 2 |
| Ns/Nc | 2,4 | 2 |

Fuente: ENSSyR 2013.

En el total de la población de varones, la media de hijos es de 2,6.

Observándose los datos por región, Noreste y Noroeste son quienes muestran mayor media de hijos por varón, con 3,2 y 3,0 respectivamente, en contraposición a las regiones GBA y Pampeana, con 2,5.

Al igual que entre las mujeres, la fecundidad crece a medida que aumenta la edad: de una media de 1 hijo por varón entre los de 14 a 19 años, asciende a 2,8 entre los de 40 a 49 años y a 3,3 entre los de 50 a 59 años. La situación conyugal mantiene esta tendencia: unidos y casados tienen una media mayor de hijos por varón que los solteros, con una diferencia significativa entre ambos grupos.

Al analizar por rango de ingreso del hogar, al igual que lo observado para las mujeres, en el rango de hogares de menor ingreso la media es de 2,9 hijos por varón, descendiendo hasta llegar a una media de 2,3 hijos en el rango de \$10.001 y más. Por nivel de instrucción la tendencia es similar: a menor nivel de instrucción, más alta es la media de hijos, con un 3,1 en la categoría hasta primario completo y 2,2 hijos por varón en el nivel de instrucción más alto.

Tabla 18. Media y mediana (en años) de cantidad de hijos nacidos vivos en varones de 14 a 59 años, por región, grupo de edad, situación conyugal, rango de ingreso del hogar y nivel de instrucción. Localidades de 2.000 y más habitante. Total del país. Junio de 2013

| Varones de 14 a 59 años | Cantidad de hijos nacidos vivos | |
|--|---------------------------------|---------|
| | Media | Mediana |
| Total del país | 2,6 | 2 |
| Región | | |
| GBA | 2,5 | 2 |
| Pampeana | 2,5 | 2 |
| Noroeste | 3,0 | 3 |
| Noreste | 3,2 | 2 |
| Cuyo | 2,7 | 2 |
| Patagónica | 2,6 | 2 |
| Grupo de edad | | |
| 14 a 19 años | 1,0 | 1 |
| 20 a 29 años | 1,5 | 1 |
| 30 a 39 años | 2,1 | 2 |
| 40 a 49 años | 2,8 | 3 |
| 50 a 59 años | 3,3 | 3 |
| Situación conyugal | | |
| Unido o casado | 2,7 | 2 |
| Separado, divorciado o viudo | 2,5 | 2 |
| Soltero | 1,4 | 1 |
| Nivel de instrucción | | |
| Hasta primario completo | 3,1 | 3 |
| Secundario incompleto | 2,5 | 2 |
| Secundario completo | 2,5 | 2 |
| Terciario o Universitario incompleto y más | 2,2 | 2 |
| Rango de ingreso del hogar | | |
| 0 hasta 4.500 | 2,9 | 2 |
| 4.501 hasta 10.000 | 2,5 | 2 |
| 10.001 y más | 2,3 | 2 |
| Ns/Nc | 2,6 | 2 |

Fuente: ENSSyR 2013.

5. Conocimiento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH

Casi el 100% de las mujeres manifestó conocer el VIH/SIDA y un 90% la hepatitis B, seguida de un 75% que mencionó la sífilis, y un 67% el herpes genital. Cerca de la mitad de las mujeres conoce la gonorrea/blenorragia y los condilomas/verrugas genitales. Cada una del resto de las infecciones de transmisión sexual (candidiasis, clamidia, leucorrea y tricomoniasis) fue mencionada por menos del 20% de los entrevistados.

En la comparación por región, se observa que existe un amplio y uniforme conocimiento del VIH/SIDA; luego, con relación a otras infecciones, se presentan algunas diferencias. Las regiones más subrepresentadas en este sentido son casi siempre Noroeste y Noreste en donde el conocimiento de la hepatitis B, la sífilis, el herpes genital, la gonorrea/blenorragia y los condilomas/verrugas genitales es menor que en las otras regiones. En relación con el resto de las ITS -de menor conocimiento general- se muestran diferencias de menor magnitud entre regiones.

Al analizar por grupos de edad, se observa que el conocimiento de VIH/SIDA es cercano al 100% para todos los tramos. Por el contrario, en el resto de las infecciones, el grado de conocimiento aumenta de modo proporcional a la edad. En algunas ITS (sífilis/chancro y herpes genital) estas diferencias porcentuales entre las más y las menos jóvenes, llegan a los 35 puntos porcentuales, aproximadamente.

Por último, observando por nivel de instrucción, se reitera la misma tendencia de extendido conocimiento respecto del VIH, pero mostrándose grandes diferencias por nivel de instrucción respecto de las demás ITS.

La tendencia general es que el grado de conocimiento aumenta de modo progresivo con el nivel de instrucción. Por ejemplo, ocho de cada diez mujeres con hasta primario completo conocen la hepatitis B, pero sólo seis de cada diez la sífilis, y menos de cuatro de cada diez el resto de las ITS. Por el contrario, en los niveles de instrucción más altos, alrededor de nueve de cada diez conocen la hepatitis B, la sífilis y el herpes genital; siete de cada diez, la gonorrea/blenorragia y los condilomas/verrugas genitales, y entre dos y tres de cada diez, las demás infecciones.

Para todas las ITS, excepto el VIH/SIDA y la hepatitis B, se observa una acentuada diferencia en el porcentaje de conocimiento de las mujeres con hasta secundario incompleto y aquellas con secundario completo en adelante.

Tabla 19. Conocimiento de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA en mujeres de 14 a 49 años, por región, grupo de edad y nivel de instrucción. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013

| Mujeres de 14 a 49 años | Conocimiento de infecciones de transmisión sexual | | | | |
|---|---|-------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| | VIH/SIDA | Hepatitis B | Sífilis/ chancro | Herpes genital | Gonorrea/ blenorragia |
| Total | 98,6 | 90,5 | 75,3 | 66,6 | 48,5 |
| Región | | | | | |
| GBA | 99,1 | 93,5 | 78,0 | 73,4 | 49,2 |
| Pampeana | 98,5 | 92,0 | 76,8 | 70,0 | 49,3 |
| Noroeste | 97,8 | 85,3 | 69,7 | 53,7 | 44,3 |
| Noreste | 97,3 | 81,3 | 69,9 | 50,3 | 43,8 |
| Cuyo | 98,8 | 90,0 | 72,5 | 65,1 | 49,5 |
| Patagónica | 99,2 | 90,3 | 74,1 | 60,7 | 55,7 |
| Grupo de edad | | | | | |
| 14 a 19 años | 96,7 | 82,0 | 50,8 | 43,9 | 29,4 |
| 20 a 29 años | 99,5 | 91,7 | 76,3 | 68,3 | 57,2 |
| 30 a 39 años | 99,0 | 93,0 | 84,3 | 74,5 | 50,2 |
| 40 a 49 años | 98,7 | 94,1 | 86,1 | 76,2 | 53,6 |
| Nivel de instrucción | | | | | |
| Hasta primario completo | 95,4 | 83,0 | 57,9 | 41,4 | 23,0 |
| Secundario incompleto | 98,3 | 85,5 | 57,6 | 50,2 | 32,2 |
| Secundario completo | 99,5 | 94,4 | 87,0 | 79,3 | 56,1 |
| Terciario o Universitario incompleto y más | 100,0 | 96,9 | 94,0 | 87,7 | 72,7 |

(continúa)

Tabla 19. (conclusión)

| Mujeres de 14 a 49 años | Conocimiento de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | Condilomas/ verrugas genitales | Candidiasis | Clamidia | Leucorrea | Tricomoniasis |
| Total | 48,1 | 19,7 | 18,9 | 13,8 | 13,1 |
| Región | | | | | |
| GBA | 52,0 | 20,6 | 20,8 | 13,3 | 13,1 |
| Pampeana | 52,0 | 21,7 | 18,1 | 14,2 | 13,5 |
| Noroeste | 38,4 | 15,2 | 15,8 | 13,4 | 14,0 |
| Noreste | 39,8 | 16,8 | 18,3 | 16,1 | 13,9 |
| Cuyo | 39,1 | 20,5 | 19,2 | 13,8 | 12,5 |
| Patagónica | 44,9 | 16,9 | 19,4 | 12,0 | 8,4 |
| Grupo de edad | | | | | |
| 14 a 19 años | 32,3 | 7,4 | 12,0 | 8,0 | 6,7 |
| 20 a 29 años | 50,0 | 16,5 | 20,5 | 14,4 | 12,7 |
| 30 a 39 años | 51,6 | 26,6 | 20,3 | 15,9 | 12,3 |
| 40 a 49 años | 55,6 | 26,9 | 21,6 | 16,2 | 19,4 |
| Nivel de instrucción | | | | | |
| Hasta primario completo | 30,8 | 7,6 | 7,6 | 10,6 | 5,9 |
| Secundario incompleto | 35,1 | 7,4 | 10,4 | 8,3 | 6,6 |
| Secundario completo | 54,0 | 19,1 | 15,7 | 15,4 | 11,3 |
| Terciario o Universitario incompleto y más | 65,8 | 37,9 | 34,7 | 19,8 | 24,0 |

Fuente: ENSSyR 2013.

Un 98% de los varones manifestaron conocer al VIH/SIDA, un 87% a la hepatitis B y un 78% a la sífilis/chancro. En menor proporción, el 60% conoce el herpes genital, el 49% la gonorrea/blenorragia y un 33% a los condilomas/verrugas genitales. Con porcentajes de alrededor del 10% se ubica el conocimiento de cada una de las restantes ITS.

En la comparación por región, al igual que entre las mujeres, el conocimiento del VIH/SIDA se acerca al 100%, pero se presenta una mayor variación en el resto de las infecciones de transmisión sexual. A este respecto, las regiones más sobrerrepresentadas son, en casi todos los casos, GBA y Pampeana, y las regiones que menor conocimiento poseen respecto a la mayoría de las ITS son Noreste, Noroeste y Cuyo.

En el análisis por grupo de edad, los varones de 14 a 19 años son quienes muestran menor conocimiento de ITS, a excepción del VIH/SIDA, con importantes diferencias porcentuales con relación a los varones más adultos. Los grupos de edades intermedias -20 a 39 años- se destacan por estar sobrerrepresentados en el conocimiento de la hepatitis B. Los varones de edad más avanzada, entre 50 y 59 años, presentan mayor conocimiento de ITS como sífilis y gonorrea/blenorragia, y porcentajes por encima del total entre las ITS menos mencionadas.

Al igual que lo que se observa en las mujeres, el conocimiento de ITS en los varones es directamente proporcional al nivel educativo para todas las ITS. Los varones con menor nivel de instrucción están ampliamente subrepresentados, con diferencias porcentuales de hasta 20 puntos en relación con el total de la población. En el otro extremo, entre ocho y nueve de cada diez varones con terciario, universitario incompleto o superior, conocen la hepatitis B, la sífilis/chancro, el herpes genital y la gonorrea/blenorragia, mientras que entre los que tienen primario completo o secundario incompleto son seis, cuatro y tres de cada diez, respectivamente.

Tabla 20. Conocimiento de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA en varones de 14 a 59 años, por región, grupo de edad y nivel de instrucción. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013

| Varones de 14 a 59 años | Conocimiento de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|----------------|----------------------|
| | VIH/SIDA | Hepatitis B | Sífilis/chancro | Herpes genital | Gonorrea/blenorragia |
| Total del país | 98,1 | 86,5 | 77,9 | 60,3 | 48,8 |
| Región | | | | | |
| GBA | 98,5 | 92,7 | 78,7 | 68,8 | 53,0 |
| Pampeana | 98,7 | 87,8 | 81,5 | 63,4 | 47,9 |
| Noroeste | 96,8 | 78,8 | 74,0 | 47,0 | 43,5 |
| Noreste | 95,7 | 70,8 | 72,5 | 47,2 | 38,8 |
| Cuyo | 98,5 | 86,3 | 72,4 | 47,4 | 46,2 |
| Patagónica | 98,3 | 84,0 | 74,6 | 54,2 | 59,5 |
| Grupo de edad | | | | | |
| 14 a 19 años | 97,7 | 79,1 | 50,6 | 41,7 | 29,3 |
| 20 a 29 años | 98,9 | 91,0 | 79,1 | 66,4 | 51,1 |
| 30 a 39 años | 98,4 | 90,3 | 82,0 | 64,5 | 51,2 |
| 40 a 49 años | 98,0 | 83,7 | 91,4 | 67,6 | 54,5 |
| 50 a 59 años | 97,1 | 87,4 | 90,0 | 60,6 | 60,2 |
| Nivel de instrucción | | | | | |
| Hasta primario completo | 94,9 | 77,8 | 67,6 | 37,8 | 28,3 |
| Secundario incompleto | 98,1 | 82,8 | 64,7 | 47,6 | 34,5 |
| Secundario completo | 99,5 | 90,7 | 91,5 | 75,9 | 56,8 |
| Terciario o Universitario incompleto y más | 99,7 | 95,9 | 93,7 | 84,6 | 80,2 |


(continúa)

Tabla 20. (conclusión)

| Varones de 14 a 59 años | Conocimiento de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA | | | | |
|---|--|-------------|-------------|------------|---------------|
| | Condilomas/ verrugas genitales | Candidiasis | Clamidia | Leucorrea | Tricomoniasis |
| Total del país | 33,2 | 9,9 | 12,4 | 9,2 | 8,0 |
| Región | | | | | |
| GBA | 33,5 | 11,6 | 14,8 | 7,4 | 9,0 |
| Pampeana | 39,6 | 9,3 | 12,3 | 11,0 | 7,2 |
| Noroeste | 27,8 | 9,5 | 9,0 | 10,4 | 8,4 |
| Noreste | 24,8 | 9,5 | 9,0 | 8,8 | 8,2 |
| Cuyo | 22,2 | 7,2 | 10,5 | 9,0 | 5,7 |
| Patagónica | 28,2 | 7,8 | 12,9 | 8,1 | 7,4 |
| Grupo de edad | | | | | |
| 14 a 19 años | 18,0 | 4,0 | 6,9 | 6,4 | 5,5 |
| 20 a 29 años | 38,5 | 10,2 | 17,4 | 9,5 | 8,0 |
| 30 a 39 años | 32,1 | 9,2 | 10,3 | 8,5 | 8,0 |
| 40 a 49 años | 39,1 | 11,6 | 11,6 | 8,0 | 6,6 |
| 50 a 59 años | 38,9 | 15,7 | 15,2 | 14,9 | 12,6 |
| Nivel de instrucción | | | | | |
| Hasta primario completo | 23,8 | 2,7 | 4,4 | 5,1 | 2,6 |
| Secundario incompleto | 22,6 | 5,3 | 7,2 | 7,0 | 5,8 |
| Secundario completo | 34,0 | 9,5 | 13,5 | 9,1 | 9,6 |
| Terciario o Universitario incompleto y más | 55,7 | 23,3 | 25,8 | 16,3 | 14,4 |

Fuente: ENSSyR 2013.

Gráfico 4. Conocimiento de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA en mujeres de 14 a 49 años y varones de 14 a 59 años, por sexo. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013



Fuente: ENSSyR-2013.

6. Cantidad de controles realizados durante el embarazo/ Universo: mujeres

Más de nueve de cada diez mujeres declararon haberse realizado cinco o más controles durante el embarazo de su último hijo nacido vivo. Es de destacar que son muy poco significativos los casos en los que no se ha realizado ningún control.

Al analizarse por región, este indicador está levemente sobrerrepresentado en el caso de GBA, siendo más bajo en la región Patagónica, con un 86%. Con relación a los grupos de edad, las mujeres de 30 a 39 años manifestaron haberse realizado cinco o más controles en un 95% de los casos, algo por encima del total.

Con respecto a la situación conyugal, son las solteras quienes menos controles se han realizado durante el embarazo, con un 84%.

Por último, en cuanto a nivel de instrucción, no se observan diferencias relevantes vinculadas a este indicador.

Tabla 21. Cantidad de controles realizados en el embarazo en mujeres de 14 a 49 años, por región, grupo de edad, situación conyugal y nivel de instrucción. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013

| Mujeres de 14 a 49 años | Cantidad de controles realizados durante el embarazo | | | |
|--|--|----------------|-------------|------------|
| | Total | Menos de cinco | Cinco o más | Ns/Nc |
| Total | 100 | 6,3 | 93,2 | 0,5 |
| Región | | | | |
| GBA | 100 | 4,3 | 95,2 | 0,5 |
| Pampeana | 100 | 6,7 | 92,7 | 0,6 |
| Noroeste | 100 | 7,1 | 92,7 | 0,2 |
| Noreste | 100 | 8,1 | 91,8 | 0,1 |
| Cuyo | 100 | 5,4 | 94,6 | -- |
| Patagónica | 100 | 12,5 | 86,0 | 1,5 |
| Grupo de edad | | | | |
| 14 a 19 años | 100 | 7,9 | 90,0 | 2,1 |
| 20 a 29 años | 100 | 8,0 | 92,0 | -- |
| 30 a 39 años | 100 | 4,4 | 95,3 | 0,3 |
| 40 a 49 años | 100 | 6,9 | 92,4 | 0,7 |
| Situación conyugal | | | | |
| Unida | 100 | 6,4 | 93,1 | 0,4 |
| Casada | 100 | 4,8 | 94,8 | 0,4 |
| Separada | 100 | 4,4 | 94,3 | 1,2 |
| Divorciada | 100 | 0,8 | 99,2 | -- |
| Viuda | 100 | 4,5 | 95,5 | -- |
| Soltera | 100 | 15,3 | 84,4 | 0,3 |
| Nivel de instrucción | | | | |
| Hasta primario completo | 100 | 9,2 | 90,3 | 0,5 |
| Secundario incompleto | 100 | 6,1 | 93,4 | 0,4 |
| Secundario completo | 100 | 4,3 | 94,7 | 1,0 |
| Terciario o Universitario incompleto y más | 100 | 5,5 | 94,5 | -- |

Fuente: ENSSyR 2013.

7. Lactancia/Universo: mujeres

Respecto de la lactancia, un 94% de las mujeres le dieron el pecho a su último hijo nacido vivo, o le están dando actualmente. La lactancia está levemente sobrerrepresentada entre las mujeres de la región Noroeste, así como en el tramo de 20 a 29 años, y aumenta progresivamente con el nivel de instrucción: a mayor nivel, son más las mujeres que manifiestan haberle dado el pecho a su último hijo.

Tabla 22. Lactancia de su último hijo nacido vivo en mujeres de 14 a 49 años, por región, grupo de edad y nivel de instrucción. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013

| Mujeres de 14 a 49 años | Lactancia de su último hijo nacido vivo | | |
|--|---|----------------------------|---------------------|
| | Total | Le dió o le da actualmente | No le dió/ no le da |
| Total | 100 | 93,5 | 6,5 |
| Región | | | |
| GBA | 100 | 92,3 | 7,7 |
| Pampeana | 100 | 93,2 | 6,8 |
| Noroeste | 100 | 96,5 | 3,5 |
| Noreste | 100 | 94,6 | 5,4 |
| Cuyo | 100 | 93,9 | 6,1 |
| Patagónica | 100 | 93,3 | 6,7 |
| Grupo de edad | | | |
| 14 a 19 años | 100 | 90,8 | 9,2 |
| 20 a 29 años | 100 | 96,8 | 3,2 |
| 30 a 39 años | 100 | 94,0 | 6,0 |
| 40 a 49 años | 100 | 91,6 | 8,4 |
| Nivel de instrucción | | | |
| Hasta primario completo | 100 | 90,8 | 9,2 |
| Secundario incompleto | 100 | 92,1 | 7,9 |
| Secundario completo | 100 | 94,3 | 5,7 |
| Terciario o Universitario incompleto y más | 100 | 96,4 | 3,6 |

Fuente: ENSSyR 2013.

Con relación a la edad hasta la que le dieron el pecho a su último hijo nacido vivo, la mitad de las mujeres lo hicieron hasta antes de los 12 meses. De las restantes, una cuarta parte dejó de amamantar entre los 12 y los 24 meses.

Se observa que las mujeres con menor nivel de instrucción declararon un tiempo de lactancia más extenso del último hijo nacido vivo (de 18 meses en adelante).

Tabla 23. Edad del hijo hasta que le dió el pecho en mujeres de 14 a 49 años que le dieron el pecho a su último hijo nacido vivo, por nivel de instrucción. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Junio de 2013

| Mujeres de 14 a 49 años | Edad de su último hijo nacido vivo hasta la que le dió el pecho | | | | | | Ns/Nc |
|--|---|------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| | Total | Menos de 6 meses | De 6 hasta menos de 12 meses | De 12 hasta menos de 18 meses | De 18 hasta menos de 24 meses | 24 meses y más | |
| Total del país | 100 | 27,7 | 20,4 | 17,3 | 10,5 | 23,1 | 1,0 |
| Nivel de instrucción | | | | | | | |
| Hasta primario completo | 100 | 29,5 | 12,7 | 15,8 | 13,3 | 26,5 | 2,2 |
| Secundario incompleto | 100 | 24,1 | 18,3 | 16,1 | 11,1 | 29,8 | 0,6 |
| Secundario completo | 100 | 31,0 | 19,7 | 19,3 | 8,2 | 21,7 | 0,2 |
| Terciario o Universitario incompleto y más | 100 | 26,0 | 28,9 | 17,7 | 9,9 | 16,3 | 1,1 |

Fuente: ENSSyR 2013.