¿Qué es la anafilaxia?

- Es una reacción alérgica grave que puede comprometer la vida de la persona en minutos.
- Requiere atención inmediata.

¿Cuáles son las causas más frecuentes?

- **Alimentos:** maní, frutos secos, leche, huevo, mariscos, pescado, entre otros.
- **Picaduras o mordeduras de insectos:** abejas, avispas.
- **Medicamentos:** antibióticos (como la penicilina), antiinflamatorios, entre otros.
- Látex.

Síntomas para detectarla


Hinchazón, picazón, urticaria, sarpullido en la piel.



Dificultad respiratoria.



Palpitaciones, mareos.



Calambres abdominales.



CONOCER LOS SÍNTOMAS ES CLAVE PARA ACTUAR

Si la persona tiene dos o más, puede estar atravesando una reacción alérgica grave.

Plan de acción

1 Colocar al paciente acostado con las piernas elevadas y **llamar al 107.**



2 **Administrar el autoinyector o ampolla de adrenalina** en la cara externa de la pierna (muslo).



3 Si **no hay respuesta** a la **primera dosis** de adrenalina dentro de los **5 minutos,** administrar la **segunda** en el otro muslo (cara externa).



4 Aunque el estado del paciente mejore, **siempre debe ser trasladado a un centro de salud u hospital.**



LA ADRENALINA SALVA VIDAS

ACTUÁ RÁPIDO


AMPOLLA

CÓMO APLICARLA

En la cara lateral externa del muslo.

Insertar la aguja a 90°, inyectar todo el contenido y retirarla.

Masajear suavemente la zona durante unos segundos para favorecer la absorción.



DOSIS

Identificar la marca en la jeringa según la edad/peso del paciente:

NIÑOS
0,15 ml (0,15 mg)

ADULTOS
0,3 ml (0,3 mg)

AUTOINYECTOR



No tiene contraindicaciones

ANAFILAXIA

Ley Matías Colaprete

Número de ley: **11.242**



*En Entre Ríos, contamos con un marco legal que impulsa la **prevención, capacitación y disponibilidad de recursos** frente a la **anafilaxia** en espacios públicos e instituciones, buscando que cada vez más personas sepan **cómo actuar frente a una emergencia de este tipo.***

ANAFILAXIA

LO QUE TENÉS QUE SABER

ER MINISTERIO DE SALUD

ER MINISTERIO DE SALUD