PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DE LA PROVINICA DE ENTRE RÍOS
AREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA-DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Recomendaciones ante casos de parotiditis

Con motivo del aumento de casos de parotiditis en adolescentes y adultos jóvenes en Ciudad de Gualeguaychú , Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego, y el reporte de brotes en distintos lugares del país (afectando principalmente al grupo de edad citado), el Ministerio de Salud de la Provincia en forma conjunta con Nación recomienda, ante casos de parotiditis, adoptar las siguientes medidas de vigilancia, prevención y control:

- Aislamiento: de tipo respiratorio de casos sintomáticos y hasta los 9 días a partir del inicio de los síntomas: excluir de escuelas e instituciones *(se aislaron virus en saliva hasta 8 días después de la aparición de la inflamación)*

- No se recomienda cuarentena ni cierre de instituciones.

- Revisar carnet de vacunas y asegurar esquemas completos, en especial en grupos de personas que comparten dormitorios o están en condiciones de hacinamiento: cárceles, escuelas, fuerzas armadas, contingentes que asisten a eventos sociales y/o deportivos (la concurrencia de personas a eventos es una oportunidad para controlar carnet de vacunas y completar esquemas en los casos que lo requieran).

- Notificar los casos al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2)

- En caso de brote, notificar los mismos a través del formulario *on line* disponible en https://docs.google.com/forms/d/1vZiYxGT7RruKNp0zif9VDpGUS_B_nUItg5AHfWxOpR8/view

- Notificar los casos estudiados por laboratorio deberán notificarse a través del Sistema Nacional de Vigilancia por Laboratorio (SIVILA-SNVS)

- Información: Suministrar información a todos los contactos de los casos acerca de la enfermedad y la importancia de la consulta ante aparición síntomas, asegurar la adecuada vacunación en las personas que están en riesgo aumentado de exposición.

Vacuna
La vacuna triple viral o MMR, genera protección contra sarampión, rubeola y paperas. Alrededor del 99% de los vacunados desarrolla inmunidad para las tres enfermedades luego de la segunda dosis, para el componente parotiditis la eficacia es de 75-95% y la inmunogenicidad mayor al 95%). La eficacia depende de la cepa y concentración del virus que contiene la vacuna.
Se indica a todos los niños de 12 meses y al ingreso de la edad escolar (6 años), desde el año 1998 a la fecha.

Las principales indicaciones en adultos con riesgo son las siguientes: trabajadores de la salud, trabajadores de jardines maternales, expuestos a situación de brote, viajes internacionales e

inmigraciones recientes, personal militar, estudiantes terciarios y universitarios, personas con VIH con más de 200 CD4, mujeres en edad fértil no embarazadas, personas que fueron vacunadas entre los 6 y 11 meses o aquellos vacunados con vacuna antisarampionosa solamente (1973 – 1975).

Las estrategias de vacunación recomendadas a nivel nacional son:

- Revisar esquema de vacunación con Triple Viral, según edad, comprobada por Carnet (se deben tener una dosis de triple Viral hasta el ingreso escolar y dos dosis de la vacuna a partir del ingreso escolar)

- Si no tiene esquema completo para la edad, aplicar una dosis de Triple Viral según Calendario vigente.

- Si tiene una Triple Viral y una Doble Viral, aplicar una Triple Viral para completar el esquema recomendado que contiene el componente parotiditis.

La inmunidad por vacuna puede disminuir con el tiempo, lo que explica la ocurrencia de parotiditis en personas vacunadas adultas.

Por lo expresado el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos **RECOMIENDA**:

- Revisar CARNETS de vacunación de los niños de 11 años con el fin de certificar las 2 dosis de vacuna Triple Viral, en caso de no tener las dosis, aplicarla si o si.

- En adultos jóvenes pertenecientes a Instituciones Cerradas, donde haya habido un caso sospechoso o confirmado de parotiditis (colegios,clubes,oficinas)Certificar 2 dosis de vacunas Triple Viral ,independientemente de la edad en caso de no constatar la misma completar esquema .

- Vacunar a todo el personal de salud que este en contacto con casos sospechosos o confirmados de parotiditis independientemente de la edad.

Importante: El virus continúa circulando en todo el país, afectando a personas vacunadas y no vacunadas. Existe mayor riesgo de transmisión en individuos que están en comunidades cerradas.

Tener en cuenta que la vacuna genera inmunidad a partir del decimo quinto día de aplicada por lo que puede haber casos en personas previamente vacunadas , que adquirieron la enfermedad antes de la vacunación.