Ministerio de SALUD
Gobierno de Entre Ríos

Dirección de EPIDEMIOLOGÍA
Ministerio de Salud
Gobierno de Entre Ríos

EPI–ENTRE RIOS SE 32

REPORTE EPIDEMIOLOGICO SEMANAL

12 DE AGOSTO DE 2019 VOLUMEN 7 Nº 32

EDITORIAL

El reporte epidemiológico semanal " *Epi-Entre Ríos*" es elaborado por la Residencia de Epidemiología del Ministerio de Salud de Entre Ríos. El mismo esta destinado a todo el personal de salud y publico en general interesado en la situación sanitaria provincial, nacional e internacional.

La información contenida es procedente tanto de los Sistemas de Vigilancia, de las Investigaciones en salud como de medios informales, previamente verificados.
Este reporte busca brindar un panorama inmediato y actualizado de la situación epidemiológica y condiciones de alto riesgo potencial para la salud de la población, que suponen acciones de prevención, control o seguimiento, siempre con la mirada puesta en mejorar la salud de la población.

CONTENIDOS

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ENTRE RÍOS SE 32

INFORMES DE EVENTOS PRIORIZADOS

NOTICIAS EN SALUD

RECOMENDACIONES DE SALUD

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

RECLASIFICACIÓN DE CASOS DE LA SE 32

PATOLOGÍAS	FUENTE	CLASIFICACIÓN	EDAD	SEXO	SE	DEPARTAMENTO PACIENTE
MENINGOENCEFALITIS	HOSPITAL MASVERNAT	CONFIRMADO	5 MESES	F	30	CONCORDIA
COQUELUCHE	HOSPITAL SANTA ROSA CHAJARI	PROBABLE	7 MESES	M	30	FEDERACIÓN
COQUELUCHE	HOSPITAL MASVERNAT	PROBABLE	1 MES	F	30	CONCORDIA
LEPTOSPIROSIS	HOSPITAL SAN MARTIN PARANA	DESCARTADO	29 AÑOS	M	30	PARANÁ
PSITACOSIS	HOSPITAL CENTENARIO	DESCARTADO	52 AÑOS	F	24	GUALEGUAYCHÚ
LEPTOSPIROSIS	HOSPITAL SAN JOSE DIAMANTE	DESCARTADO	30 AÑOS	M	31	DIAMANTE
COQUELUCHE	HOSPITAL SANTA ROSA CHAJARI	DESCARTADO	7 MESES	M	30	FEDERACIÓN

VIGILANCIA DE VIRUS INFLUENZA ACUMULADOS A LA FECHA

CASOS NOTIFICADOS	EN ESTUDIO	CONFIRMADOS INFLUENZA A	CONFIRMADOS INFLUENZA B	DESCARTADOS
237	14	31	0	192

Hasta la semana epidemiológica (SE) 32 se han confirmado 31 casos de Influenza A en la provincia de Entre Ríos, de los cuales cuatro fueron confirmados en la SE 32: uno de estos casos oriundo del departamento Paraná, uno de Victoria, uno de Gualeguaychú y otro de la provincia de Santa Fe. Además, tres pertenecen al grupo de riesgo por lo que debieran estar vacunados y sólo uno lo estaba. En cuanto a la evolución, tres de estos casos confirmados se encuentran con buena evolución y uno internado en UTI con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica.
En la semana del 4 al 10 de Agosto de 2.019 (SE 32), los promedios de ocupación de camas por Insuficiencias Respiratorias Agudas en la provincia fueron los siguientes: Sala general adultos: 10%; Sala general pediátrica: 25%; Unidad de terapia intensiva adultos: 21,43%; Unidad de terapia intensiva pediátrica: 12,90%.
Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos.

P S I T A C O S I S

¿QUE ES LA PSITACOSIS?

La Psitacosis es una enfermedad zoonótica infecciosa aguda, es decir, una enfermedad que puede transmitirse entre animales y seres humanos, es transmitida por las aves al hombre.
Las aves enfermas se reconocen cuando presentan abatimiento, perdida de peso, conjuntivitis, diarrea, dificultad respiratoria.
Eliminan bacterias al medio ambiente por secreciones de los ojos, vías aéreas superiores, polvo de las plumas y excrementos, que al secarse, flotan en el aire y son inhalados por el ser humano.
Las aves aparentemente sanas pueden ser portadoras, diseminan al agente infeccioso en condiciones de stress.
Por lo general son casos esporádicos o se limitan al grupo familiar.

¿CUÁNDO SOSPECHAR?

Ante toda persona con fiebre de comienzo brusco acompañada de dolor de cabeza y cuadros neumónicos, con antecedente de presentar o haber presentado exposición o contactos con aves en un período no mayor a 4 semanas del inicio de los síntomas.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIRLA

- No comprar aves en la via pública o en locales sin asesoramiento de un veterinario.
- Exigir el certificado de sanidad cuando se compra un ave.
- Mantener las aves en lugares ventilados.
- El espacio de la jaula deberá ser acorde al tamaño del ave o al número de aves.
- Limpiar diariamente las jaulas.
- Colocar en el piso de la jaula papel humedecido con desinfectante (ej: formol al 1% o lavandina al 9%).
- Observar a las aves diariamente con respecto a su comportamiento y estado de salud.
- Consultar de inmediato a un veterinario ante la sospecha de enfermedad de las aves. No liberarlas, ya que pueden difundir la enfermedad.
- En caso de muerte de un ave, colocarla en una bolsa de plastico y consultar de inmediato con un veterinario.

SITUACIÓN PROVINCIAL

En Entre Ríos, hasta la SE 32 de 2.019, se han noficado al departamento de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de Entre Ríos un total de 22 casos sospechosos, confirmándose solo 1 caso. La Psitacosis es un evento de noficación obligatoria y su denuncia debe ser inmediata al Sistema de Vigilancia de Salud mediante ficha correspondiente.

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos.

NOTICIAS EN SALUD

NOTICIAS PROVINCIALES

ENTRE RÍOS: SALUD DEFINE ESTRATEGIAS CON LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA MEJORAR LAS COBERTURAS EN VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

Responsables de los centros de atención primaria de toda la provincia participaron de una jornada de trabajo en Paraná. Allí repasaron la información de dosis aplicadas a la fecha y delinearon estrategias para alcanzar a la población de riesgo que aún no acudió a los vacunatorios.

Durante la actividad el equipo del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) brindó un informe pormenorizado del estado de avance de la campaña de vacunación antigripal, donde se mostró que las aplicaciones realizadas a la fecha están por debajo del 60 por ciento de la meta de cobertura total.

Tras exponer los datos de los diferentes grupos de riesgo, a partir del monitoreo de las dosis registradas en el sistema informático (Nomivac), se hizo especial hincapié en la necesidad de mejorar las índices en dos de los grupos: Por un lado las embarazadas, donde se llegó al 49 por ciento de la meta (y todavía se deben aplicar 8.370 dosis en toda la provincia); y además en niños de 6 a 24 meses, donde se llegó al 63 por ciento (y de acuerdo a las proyecciones iniciales aún restan ser aplicadas 12.013 dosis).

A fin de mejorar estos guarismos, los centros de salud acordaron ajustar destalles como la realización de tareas extramuros para buscar en terreno a la población que no recibió ninguna dosis antigripal; concientizar en todos los ámbitos que estos dos grupos deben recibir la vacuna; y mantener actualizado el registro digital de las dosis aplicadas, ya que esto permite monitorear el avance de las metas y el stock disponible en cada establecimiento.

Fuente: Ministerio de Salud de Entre Ríos Fecha: 09/08/2019.

NOTICIAS INTERNACIONALES

BRASIL: LOS NIÑOS QUE VIAJEN A LUGARES EN RIESGO DE SARAMPIÓN DEBEN SER VACUNADOS.

El Ministerio de Salud de Brasil advierte a los padres, madres y tutores que viajarán con sus hijos de seis meses a un año de edad a municipios con un brote de sarampión activo en el país.

Se recomienda que todos los niños de este grupo de edad sean vacunados contra la enfermedad al menos 15 días antes de la fecha de viaje programada. Además de proteger, la medida de seguridad tiene como objetivo interrumpir la cadena de transmisión del virus del sarampión. Actualmente, 43 ciudades en tres estados brasileños (São Paulo, Río de Janeiro y Bahía) permanecen activas, es decir, con un aumento en el número de casos confirmados de la enfermedad.

La vacunación del calendario de los niños debe mantenerse independientemente de los arreglos de viaje para los sitios con brote de sarampión activo.

En los últimos 90 días, el Ministerio de Salud ha registrado 907 casos confirmados de sarampión en Brasil, en tres estados: São Paulo (901), Río de Janeiro (5) y Bahía (1).) La tasa de incidencia de la enfermedad fue de 0,4 por 100.000 habitantes.

El país proviene de una historia de no registrar casos autóctonos desde 2000. Entre 2013 y 2015, ocurrieron dos brotes de la enfermedad de casos importados en los estados de Ceará y Pernambuco, con 1.310 casos. Los brotes se controlaron con medidas de bloqueo de vacunas, y en 2016 Brasil recibió el Certificado de Eliminación del Sarampión emitido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Brasil perdió el certificado en febrero de este año y actualmente está haciendo todo lo posible para eliminar la transmisión del virus nuevamente en el país, con un mejor programa de vacunación.

Mantener una cobertura de vacunas alta y homogénea en la población es la única forma de prevenir la transmisión de la enfermedad.

Fuente: Ministerio de Salud de Brasil Fecha: 06/08/2019.

RECOMENDACIONES DE SALUD

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS

¿COMO PREVENIRLAS?

- Evitá el humo de cigarrillo, de leña o de braseros.
- Mantené una ventana entreabierta donde hay brasas o una llama (porque producen un gas venenoso que no ene olor: el monóxido de carbono).
- Evitá que se junte vapor en los ambientes cerrados.
- Alimentá a tu bebé exclusivamente con leche materna hasta los 6 meses, y ofrecele el pecho con más frecuencia cuando está enfermo. A partir de los 6 meses, comienza con sólidos adecuados.
- Aplicale a tus hijos las vacunas.
- Evitá que tu bebé esté en contacto con personas que padezcan una infección respiratoria (resfrío, tos, estornudos, etc.).
- Lavate muy bien las manos antes de atender al bebé y después de ir al baño o cambiarle los pañales.
- Cubrite siempre la boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el pliegue del codo, para evitar contagiar a otros.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

Dirección de
EPIDEMIOLOGÍA
Ministerio de Salud
Gobierno de Entre Ríos

RESIDENCIA DE EPIDEMIOLOGÍA
25 DE MAYO 139, PARANÁ
TELÉFONO/FAX:0343-4840187
CORREO ELECTRÓNICO: resepier@yahoo.com.ar