Ministerio de
SALUD
Gobierno de Entre Ríos

Dirección de
EPIDEMIOLOGÍA
Ministerio de Salud
Gobierno de Entre Ríos

EPI- ENTRE RÍOS SE 37

REPORTE EPIDEMIOLOGICO SEMANAL

17 DE SEPTIEMBRE DE 2019

VOLUMEN 7 N° 37

EDITORIAL

El reporte epidemiológico semanal " *Epi-Entre Ríos*" es elaborado por la Residencia de Epidemiología del Ministerio de Salud de Entre Ríos. El mismo está destinado a todo el personal de salud y público en general interesado en la situación sanitaria provincial, nacional e internacional.

La información contenida es procedente tanto de los Sistemas de Vigilancia, de las Investigaciones en salud como de medios informales, previamente verificados.

Este reporte busca brindar un panorama inmediato y actualizado de la situación epidemiológica y condiciones de alto riesgo potencial para la salud de la población, que suponen acciones de prevención, control o seguimiento, siempre con la mirada puesta en mejorar la salud de la población.

CONTENIDOS

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ENTRE RÍOS SE 37

INFORMES DE EVENTOS

NOTICIAS EN SALUD

RECOMENDACIONES Y EFEMÉRIDES

RECLASIFICACIÓN DE CASOS DE LA SE 37

PATOLOGÍAS	FUENTE	CLASIFICACIÓN	EDAD	SEXO	SE	DEPARTAMENTO PACIENTE
Coqueluche	Sanatorio de niño	Confirmado	8 meses	M	35	Diamante
Coqueluche	Hospital Salaberry	Probable	8 meses	M	35	Victoria
Coqueluche	Hospital San Roque	Probable	1año	M	36	Gualeguay
SUH	Clinica Modelo	Confirmado	1 año	F	36	Paraná
Hidatidosis	Hospital F.Ramirez	Confirmado	75 años	M	31	Feliciano
Hidatidosis	Hospital Masvernat	Confirmado	23 años	F	37	Feliciano
Hidatidosis	Hospital F.Ramirez	Confirmado	45 años	F	37	Feliciano
Síndrome Febril	Hospital Masvernat	Descartado	65 años	M	28	Concordia
SFI	Clinica Modelo	Descartado	49 años	F	36	Paraná
Coqueluche	Sanatorio del niño	Descartado	1 mes	M	35	Paraná
Dengue	CAPS Minguillon	Descartado	25 años	M	36	Paraná
Meningoencefalitis	Hospital San Martin	Descartado	27 años	M	36	Paraná
Coqueluche	Sanatorio del niño	Descartado	2 meses	M	36	Diamante
Coqueluche	Hospital San Roque	Descartado	3 meses	F	36	Victoria
Coqueluche	Hospital Santa Rosa Chajari	Descartado	7 años	M	36	Federación
Coqueluche	Hospital San Roque	Descartado	2 meses	M	35	Tala
Coqueluche	Hospital Centenario	Descartado	1 mes	M	35	Gualeguaychú
Meningoencefalitis	Sanatorio del niño	Descartado	8 años	F	36	Paraná

VIGILANCIA DE VIRUS INFLUENZA ACUMULADOS A LA FECHA

CASOS NOTIFICADOS	EN ESTUDIO	CONFIRMADOS INFLUENZA A	CONFIRMADOS INFLUENZA B	DESCARTADOS
308	2	37	0	269

Hasta la semana epidemiológica (SE) 37, se han confirmado 37 casos de Influenza A en la provincia de Entre Ríos, continúan en estudio 2, descartados a la fecha 269.

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos.

RESUMEN DEL RELEVAMIENTO DE CAMAS OCUPADAS POR INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (IRA) SE 27-36, 2019

OCUPACIÓN DE CAMAS POR IRA PEDIÁTRICO



En la ocupación de camas por IRA en pediátricos puede observarse en sala un pico en la SE 27 (30/06-06/07) representando el 33,8% de las camas pediátricas que han notificado, para esta semana epidemiológica la ocupación de camas en terapia fue del 10,8% (del total de las instituciones que notificaron). Siendo el pico de relevamiento en camas por IRA de terapia en la SE 30 (11/08-17/08) con una ocupación del 46%.

OCUPACIÓN DE CAMAS POR IRA ADULTOS



Con respecto a la ocupación de camas por IRA en adultos el pico puede observarse tanto para sala como para terapia en la SE30 (11/08-17/08), con un porcentaje de ocupación de camas provincial del 15,5% en sala y 23,8% en terapia (del total de las instituciones que notificaron para esa semana en la provincia).

Fuente: Departamento Vigilancia. Dirección de Epidemiología. Entre Ríos.

PAROTIDITIS O PAPERAS

¿ QUÉ ES LA PAROTIDITIS?

Es una enfermedad viral aguda. Genera la inflamación de las glándulas parótidas, mayormente en niños, a pesar de la vacunación y que es erradicable, siguen apareciendo casos.

Se presenta comúnmente en niños entre 2 a 12 años que no se han vacunado, aunque no discrimina edad. Es prevenible mediante la vacuna triple viral, vacuna que protege contra el sarampión, la rubeola y la parotiditis. La vacuna, se aplica a niños entre 12 meses y 5 años, los mayores a 5 años una segunda dosis, los mayores de 5 años, deben acreditar dos dosis de vacuna doble o triple viral. Las personas nacidas antes de 1965 no requieren vacunación, ya que, se considera que están protegidos al haber estado en contacto con el virus.

No hay tratamiento específico para tratar la parotiditis. En general los casos son de buena evolución.

¿ CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS ?

Se caracteriza por presentar fiebre, hinchazón y dolor al tocar las glándulas salivales (glándula parótida, sublinguales y/o submaxilares). Puede generar complicaciones como pancreatitis, encefalitis, y otras.

En menores de 5 años, suelen presentarse, además síntomas en las vías respiratorias. Puede también, en varones, presentarse inflamación testicular (orquitis), generalmente unilateral.

¿ CÓMO SE TRANSMITE ?

Se transmite por el aire o mediante gotitas expulsadas de las vías respiratorias o por contacto directo con la saliva de personas infectadas. Por ejemplo, al estornudar, toser, etc.

Entre el contacto y presentar los síntomas, pueden pasar entre 12 a 25 días, siendo lo más común de 16 a 18 días. Aunque puede también ser asintomático.

SITUACIÓN NACIONAL Y PROVINCIAL

En este año entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la 36 (7 de septiembre) , a nivel nacional, se ha notificado un brote en Tierra del Fuego con la notificación de 241 casos, sin fallecidos.

En la provincia de Entre Ríos, en el Sistema de Vigilancia se registraron, en el año 2015 19 notificados, en el año 2016 2 notificaciones, en el año 2017 8 notificados, en el año 2018 1 notificado y en lo que va de este año no se ha registrado casos. Se recuerda que, la parotiditis es un evento de notificación obligatoria, establecido por la Ley Nacional N° 15.465 y su denuncia debe de ser debidamente notificada al Sistema de Vigilancia de Salud.

NOTICIAS NACIONALES

MSAL Nación— Recomendación de Salud ante los brotes de SARAMPION

Dada la situación regional de los brotes de sarampión, favorecido por el intercambio turístico, comercial y laboral que hoy existe, y que la circulación del virus de sarampión se encuentra activa en la región de las Américas, se solicita a la comunidad que se acerca a un centro de salud para recibir la vacuna en caso de que no se la aplicase anteriormente.

Se recuerda que, los niños de 12 meses a 5 años deben de acreditar UNA dosis de la vacuna triple viral, los mayores de 5 años con DOS dosis de vacuna doble o triple viral. Los nacidos antes de 1965 no requieren vacunación, se considera que están protegidos al haber estado en contacto con el virus.

En lo que va del año se han notificado más de 4.500 casos confirmados, mayormente en Estados Unidos y Brasil. "En Argentina la enfermedad se encuentra eliminada desde el 2000". EL sarampión es una enfermedad viral **muy contagiosa** , llevando a casos graves, con secuelas permanentes, incluso la muerte. Se propaga cuando la persona infectada elimina secreciones respiratorias (al hablar, toser, estornudar), o al estar en contacto directo con objetos, superficies contaminadas. Dentro de los síntomas, presenta: fiebre alta, secreciones nasales, conjuntivitis, tos, erupciones y/o aparición de manchas blancas en el lado interno de la mejilla.

Fortaleciendo la capacidad de los equipos de salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Secretaría, planificaron para el pasado viernes un taller con los referentes provinciales en la Ciudad de Buenos Aires.

Hasta la fecha se encuentran notificados a la Secretaría de Gobierno de Salud 3 casos confirmados de sarampión (dos niñas de 11 meses y una de 3 años), no se encontraban vacunadas con la vacuna triple viral, hasta ahora sin vinculo epidemiológico comprobable, las tres con buena evolución.

Fuente: Argentina.gob. Fecha: 11/09/2019

EFEMÉRIDES

15 de Septiembre:

Día Mundial de la Concientización sobre el Linfoma

El Linfoma es un tumor, en otras palabras, el crecimiento anormal de células del sistema linfático. Aun no se conocen las causas. Los síntomas más comunes son hinchazón de ganglios linfáticos, axilas, cuello o ingle; fiebre o sudoración nocturna; falta de apetito y pérdida de peso; dolor de cabeza; fatiga y cansancio inusual; sarpullido o picazón del cuerpo; tos o disnea. Ante la presencia de estos síntomas **no dude en consultar** a su médico. Recuerde el diagnostico precoz permite salvar vidas.

Fuente: Asociación Linfomas Argentina

RECOMENDACIONES

EL LAVADO DE MANOS PASO A PASO

1. Mojate las manos con agua de red o potabilizada.
2. Enjabonate (cualquier jabón sirve para eliminar los gérmenes).
3. Frotate muy bien las manos 20 segundos, incluidas las muñecas.
4. Enjuagate con abundante agua.
5. Secate con una toalla limpia, papel descartable o agitando las manos.

¿CUÁNDO HAY QUE LAVARSE LAS MANOS?

- Después de ir al baño o de cambiarle los pañales al bebé.
- Antes de comer, y después de manipular basura o desperdicios.
- Antes y después de manipular alimentos y/o amamantar.
- Luego de haber tocado dinero, llaves, pasamanos, animales, etc.
- Al regresar de la calle, el trabajo o la escuela.

¡Ayudá a tus hijos también a lavarse las manos!

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

Ministerio de SALUD Gobierno de Entre Ríos

RESIDENCIA DE EPIDEMIOLOGÍA

25 DE MAYO 139, PARANÁ

TELÉFONO/FAX: 0343-4840187

CORREO ELECTRÓNICO: resepier@gmail.com